

Стадирование проводится после завершения программы обследования. Используется классификация Ann-Arbor. Кроме стадии, уточняется группа прогноза и МПИ (международный прогностический индекс, что влияет на выбор терапии).

Стадии лимфомы Ходжкина

**Стадия I** (начальная): опухолью поражен один или несколько лимфоузлов в одной области.

**Стадия II** (локальное распространение): опухолью поражены две или более области лимфоузлов по одну сторону диафрагмы (дыхательной мышцы, разделяющей грудь и живот).

**Стадия III** (распространенная опухоль): опухолью поражены лимфатические узлы выше и ниже диафрагмы.

**Стадия IV** (широко распространенная опухоль): лимфома выходит за пределы лимфоузлов и селезенки и поражает один или более органов, например кости, костный мозг или печень.

Значение букв «А», «В» или «Е» после стадии

Каждая стадия лимфогранулематоза также подразделяется на категории «А» и «В», в зависимости от имеющихся у пациентов симптомов на момент постановки диагноза. У некоторых пациентов есть так называемые системные симптомы, имеющие прогностическое значение. К ним относятся лихорадка, потливость по ночам, потеря веса. В таких случаях после указания стадии ставится буква «В». Если системных симптомов нет, ставится буква «А».

Буква «Е» ставится когда лимфома Ходжкина распространяется локально по протяжению из лимфоузла в прилежащий нелимфоидный орган.

#### Прогностические группы для выбора терапии при лимфоме Ходжкина

Ранние стадии, благоприятный прогноз	Стадии I-II, без факторов риска	Стадии I-II, поражение выше диафрагмы, без факторов риска
Ранние стадии, неблагоприятный прогноз	Стадии I-II с факторами риска С или D, но без А и В факторов риска	Стадии I-II, поражение выше диафрагмы, с одним или более факторов риска
Распространенные стадии	Стадии I-II с А и В факторами риска, Стадии III-IV	Стадии III-IV

<b>Факторы риска (ФР):</b>	А – массивное средостение* В – стадия E С – ускорение СОЭ** D – ≥ 3 областей лимфатических коллекторов	А – массивное средостение* В – возраст ≥ 50 лет С – ускорение СОЭ** D – ≥ 4 областей лимфатических коллекторов
----------------------------	---	---

GHSG – German Hodgkin’s Lymphoma Study Group – Германская группа по изучению лимфомы Ходжкина

EORTC/GELA – European Organization for Research and Treatment of Cancer/ Groupe d’Etude des Lymphomes de l’Adult – Европейская организация по изучению и лечению рака/Группа по изучению лимфом у взрослых

\*Массивное средостение – максимальный диаметр опухоли более 1/3 максимального диаметра грудной клетки на прямой рентгенограмме грудной клетки

\*\*СОЭ>30 мм/час при стадии В и СОЭ>50мм/час при стадии А по Панченкову (>35 или >65 по Вестергрену)

Международный прогностический индекс (каждый пункт – 1 балл)

Альбумин < 40 г/л

Гемоглобин < 10,5 г/дл

Мужской пол

Возраст ≥ 45 лет

Стадия IV

Лейкоцитоз ≥ 15 000/мм<sup>3</sup>

Лимфопения < 8% при подсчете формулы крови или < 600/мм<sup>3</sup>